AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-4-71 172518

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

Régie de Recettes de la D. D. A.

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative,

C. C. P : CLERMONT-FERRAND 5.503-17 — *CLERMONT-FERRAND - 63*

25,00 F

Supplément n° 2 au Bulletin n° 127 d'AVRIL 1971.-

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER.-

Les risques de contaminations deviennent très importants.

En conséquence : effectuer un traitement sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C3 (voir le tableau des stades-repères transmis récemment).

: renouveler la protection sur les arbres traités dès réception du bulletin précédent.

TAVELURE DU POMMIER.-

La prochaine période favorable permettra les premières contaminations sur les variétés à débourrement précoce.

Dans les situations où les Pommiers ont atteint ou dépassé le stade C3--D (voir le tableau des stades-repères au verso), effectuer un traitement.

Dans les autres situations la protection devra être assurée dès que le stade C3 sera atteint.

OIDIUM DU POMMIER.-

Dans les vergers intéressés, profiter du traitement contre la Tavelure pour assurer la protection contre l'Oïdium.

CECIDOMYIE DES POIRETTES.- Vol en cours.

Dans les vergers de Poiriers où des dégâts sont habituellement à craindre (poirettes déformées en calebasses et contenant de nombreux asticots), effectuer un traitement avec un produit à base de lindane ou de parathion (s'il y a lieu, effectuer un traitement mixte : Tavelure - Cécidomyie).

PUCERONS ET CHENILLES DEFOLIATRICES.- (Pommiers - Pruniers - Cerisiers en particulier).

Début d'activité dans certains vergers : intervenir, s'il y a lieu.

FRAISIERS

MALADIE DES TACHES ROUGES.-

Dès le départ de la végétation, intervenir avec un produit à base de manèbe.

ACARIENS - PUCERONS.-

Activité en cours.

A la bouillie à base de manèbe utilisée contre la maladie des taches rouges (Mycosphaerella fragariae) ajouter un produit efficace contre les Acariens et les Pucerons (consulter le bulletin n° 126 de MARS 1971).

Clermont-Ferrand, le 9 Avril 1971.

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles
A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :
P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND
Directeur-Gérant : L. BOUYX.
Tirage n° 791 du 9 Avril 1971 - ABONNEMENT 1971 - Expédition n°4.
(Dernière note parue : supplément n° 1 au bulletin n° 127 d'AVRIL, le 2 Avril).

P274

TABLEAU N°2 STADES-REPERES DU POMMIER

bourgeon proprement dit

A B C C3 D

bouton de la fleur

D D E E2 F

type sans et avec feuilles développées

fleur

F F2 G H

ovaire et fruit

H I J

Matthieu